

VSV ACHTERHOEK OOST

Medium risk indicaties

- Fluxus in voorgeschiedenis
- Manuele placenta verwijdering in voorgeschiedenis
- SSRI gebruik in zwangerschap
- Benzodiazepine gebruik in zwangerschap
- BMI >35 maar <40
- Sociale indicatie / thuis situatie (vastgelegd in zwangerenbespreking)
- Pethidine tijdens de ontsluitingsfase
- > 24 uur gebroken vliezen
(tot het moment van bijstimulatie, in de regel wordt bijstimulatie gestart op de ochtend nadat de vliezen 48 uur gebroken zijn)
- Cliënten uit AZC (asielzoekerscentrum)
- Een congenitaal afwijkend kind waarbij consult kinderarts binnen 24-48 uur geïndiceerd is, bijvoorbeeld pes equinovares of pyelectasie met advies antibiotica te starten post partum.
(indien toch wens thuispartus bestaat moet dit bespreekbaar zijn indien verantwoord)
- Hoogstaand caput durante partu
- Een eerstelijns verloskundige die niet NLS-geschoold is in het SKB
- “niet plus gevoel” (in principe alleen na overleg met dienstdoend gynaecoloog)
- Overige indicaties vastgelegd in zwangerenbespreking