

VSV ACHTERHOEK OOST

Drugsgebruik PROTOCOL

Wie testen?

- Zwangeren die (hard) drugs gebruiken
- Zwangeren die harddrugs in het verleden hebben gebruikt, maar zijn gestopt
- Zwangeren met drugsverslaving en/of alcoholverslaving in anamnese

Wanneer testen?

- Handigste manier is via gynaecoloog tijdens bijvoorbeeld standaard groeiecho's. De momenten zijn dan 28 en 34 weken.
- Afname kan ook plaatsvinden door de eerste lijn. 28 en 34 weken is dat een richtlijn.

Hoe testen?

- Zwangere zelf en alleen laten plassen
 - Kan in 'doorsnee' urine potje
 - Urine maximaal 24 uur bewaren in koelkast, zsm naar het lab brengen.
 - Urine het liefst binnen kantooruren afgeven op poli 3 bloedafname
- In overleg kunnen wij het buiten kantooruren brengen, via de receptie van het ziekenhuis.
- Altijd zelf urine naar lab brengen!
 - Huisartsen labformulier gebruiken, met specifieke vraag erop schrijven 'drugsscreening'. Duidelijk aanvrager en contactgegevens opschrijven.

Waarop testen?

Standaard drugsscreening bestaat uit:

- Paracetamol
- Amfetaminen
- Barbituraten (kalmeringsmiddelen)
- Cannabis
- Cocaine
- Methadon
- Benzodiazepinen
- Methamfetamine
- Opiaten
- MDMA (XTC)
- Tricyclic (antidepressiva)

Wanneer er een drugsscreening wordt uitgevoerd wordt er standaard een kreatinine in urine bepaald. Dit om eventuele verdunning van urine te herkennen.

Bovenstaande test gaat, zoals eerder genoemd, om een screening. Bij eventuele verdenking van misbruik, dient er een bevestiging uitgevoerd te worden.

Urine wordt bij het lab 7 dagen bewaard. Als je binnen die 7 dagen belt, contact opneemt met het lab, kan er nog een bevestigingsonderzoek worden toegevoegd.

Skb screent niet op alcohol in urine, alleen via bloedonderzoek.

Tabel 1: In de tabel zie je hoe lang drugs in de **urine** aantoonbaar zijn.

Tabak	Tot 2 dagen
Cannabis	Tot 5 dagen bij incidenteel gebruik, tot een maand bij frequent gebruik
Cocaïne / coke	2 tot 5 dagen bij incidenteel gebruik, tot 8 dagen bij intensief gebruik
XTC / MDMA	1 tot 3 dagen
Amfetamine / speed	1 tot 4 dagen
4-fluoramfetamine (4-FA / 4-FMP)	2 tot 4 dagen
Truffels / Paddo's	1 tot 2 dagen
GHB	Tot 12 uur
Ephedra	Tot 3 dagen
LSD	Tot 2 dagen
Heroïne	2 tot 5 dagen
Morfine	2 tot 3 dagen
Opium	2 tot 3 dagen
Methadon	2 tot 5 dagen
Benzodiazepine (slaap- en kalmeringsmiddelen)	2 tot 4 dagen bij therapeutisch gebruik, bij chronisch gebruik 4 tot 6 weken
Mescaline	Tot 72 uur
DMT	Tot 72 uur
PCP	2 tot 3 dagen
Khat / qat	Tot 3 dagen
Lachgas	Niet aantoonbaar
Ketamine	48 uur

Welke actie bij weigering test?

- Risico's drugsgebruik uitgebreid benoemen en reden van screening.
- Uitleg geven dat dit wantrouwen wekt bij zorgverlening, test wordt dan beschouwd als positief!

Welke actie bij positieve test?

- Indien beide negatief: geen actie
- Indien één van beide of beide positief: MR partus, drugsscreening bij opname. Wanneer bij partus test positief is, BV ontraden en 72 uur observatie kind. Uitslag drugsscreening na ongeveer 1 uur binnen. Indien negatief, geen actie post partum.

Beleid t.a.v. zwangerschap/bevalling/kraambed bij positieve test

Zwangerschap

- Zo lang testen positief zijn, blijven herhalen. Opnieuw instructies geven over risico's en consequenties post partum.
- Hulpverlening inschakelen, evt via zwangerPLUS, tactus etc.
- Maak een melding bij het kraamzorgbureau van de zwangere.

- Overweeg melding veilig thuis.

Bevalling

Bij positieve test(en) in zwangerschap: MR partus en bij opname herhaling urinescreening.

Kraambed

- 72 uur observatie kind

- Borstvoeding ontraden