

<i>Controle</i>	<b>Aandachtspunten</b>
<i>8-9 weken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intakegesprek bij de verloskundige of gynaecoloog</li> </ul>
<i>10-12 weken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termijnecho</li> </ul>
<i>12-16 weken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bespreking zwangere door verloskundige en gynaecoloog</li> <li>• A terme datum vaststellen</li> <li>• Bloeduitslagen bespreken</li> <li>• Kraamzorg regelen</li> <li>• Counselen SEO</li> <li>• Informatie Kinkhoestvaccinatie</li> </ul>
<i>16-18 weken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op indicatie OGTT</li> <li>• Afspraak maken SEO</li> <li>• Erkenning regelen</li> <li>• Brief intakebespreking meegeven</li> </ul>
<i>20 weken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEO/GUO</li> <li>• Plaats baring bespreken</li> <li>• Bespreken cursussen</li> </ul>
<i>24 weken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op indicatie OGTT</li> <li>• Wegen</li> <li>• Informatie minder leven mee</li> </ul>
<i>27 weken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glucose at random</li> <li>• Hb controle</li> <li>• Op indicatie RhD/Rhc bepalen</li> <li>• Op indicatie groeiecho regelen</li> <li>• Op indicatie informatie over hypertensie</li> <li>• Folder voorlichtingsavond en informatie-avond borstvoeding</li> </ul>
<i>30 weken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op indicatie anti D toedienen</li> <li>• Pijnstilling bespreken</li> <li>• Folders KNOV/deverloskundige.nl mee</li> </ul>
<i>32 weken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geboorteplan aankaarten</li> </ul>
<i>34 weken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraampakket checken</li> </ul>
<i>36 weken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huisbezoek inplannen bij mensen die thuis bevallen</li> <li>• Belinstructies bespreken</li> <li>• Geboorteplan bespreken</li> <li>• Wegen</li> <li>• Folder hielprik mee</li> </ul>
<i>37-40 weken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguliere controles</li> <li>• Bespreken hoe de zorg eruit ziet na de bevalling</li> </ul>
<i>41 weken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consult serotiniteit regelen</li> <li>• Eventueel strippen</li> </ul>
<i>Thuisbevalling</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onder begeleiding van de verloskundige met assistentie van een kraamverzorgster tussen 37+0 en 42+0 weken</li> </ul>
<i>Poliklinische bevalling</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In het ziekenhuis bevallen onder leiding van de verloskundige met assistentie van een kraamverzorgster tussen 37+0 en 42+0 weken</li> </ul>
<i>Medium risk bevalling</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op indicatie in het ziekenhuis bevallen onder leiding van de verloskundige met een verpleegkundige tussen 37+0 en 42+0 weken</li> </ul>
<i>Medische bevalling</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op indicatie in het ziekenhuis bevallen onder leiding van een klinisch verloskundige onder verantwoording van de gynaecoloog</li> </ul>
<i>Kraambed</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 t/m 8 dagen na de geboorte, in ziekenhuis op indicatie en anders thuis</li> <li>• Kraamzorg is 8 dagen bij de ouders thuis</li> <li>• De verloskundige is de eerste 10 dagen verantwoordelijk voor moeder en kind</li> <li>• Brief aan de huisarts regelen</li> </ul>
<i>Huisarts</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De huisarts neemt de zorg voor moeder en kind vanaf 10 dagen na de geboorte weer over in samenwerking met het consultatiebureau</li> </ul>
<i>Consultatiebureau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komen in week 2 thuis langs voor een huisbezoek</li> <li>• Regelen een oproep voor de gehoorscreening</li> <li>• Vervolgen de groei en ontwikkeling van het kind gedurende de eerste 4 jaar</li> </ul>
<i>Nacontrole</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na 6 weken, afhankelijk van de bevalling bij de gynaecoloog of de verloskundige</li> </ul>

