

Titel

Rectovaginale kweek afnemen

Specialisme

Obstetrie en gynaecologie

Soort document

Instructie bij het VSV-protocol betreffende preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties (GBS).

Indicaties

- Dreigende vroeggeboorte.
- Gebroken vliezen zonder weeënactiviteit (PROM). Het vaststellen van de GBS-status bij een zwangerschapsduur >37 weken en PROM gebeurt na 24 uur.

Overweeg in overleg met de zwangere het vaststellen van de GBS-status d.m.v. het afnemen van een rectovaginale kweek bij een zwangerschapsduur van 35 – 37 weken indien:


- Er sprake is van een GBS-kolonisatie tijdens een voorgaande zwangerschap of in de algemene voorgeschiedenis.
- Een eerder kind is behandeld met een klinisch beeld van early-onset neonatale sepsis/ meningitis zonder bekende verwekker waarbij sprake was van noodzaak tot kunstmatige beademing en/ of circulatoire ondersteuning.

Benodigd materiaal

- eSwab
- Onderlegger
- Onsteriele handschoenen
- Patiënten etiketten (2x)
- Aanvraagformulier (2x)

Werkwijze

1. Bereidt de patiënte voor op het uit te voeren onderzoek.
2. Neem het wattenstaafje uit de verpakking tussen duim en wijsvinger. Let op: houd het buisje rechtop zodat geen vloeistof uit het buisje wordt gemorst.
3. Breng het wattenstaafje 2 cm in de vagina en roteer voorzichtig langs de vaginale wand gedurende 5 seconden.
4. Breng vervolgens hetzelfde wattenstaafje tot net voorbij de anale sfincter en roteer voorzichtig gedurende 5 seconden.
5. Plaats het wattenstaafje met het wattenuiteinde in de vloeistof in het



- buisje. Breek het staafje af bij de breuklijn.
6. Plak het patiënten etiket op het buisje. Vergewis je van de juiste patiënte. Vul het aanvraagformulier 2x in. Vink aan: algemeen bacteriologisch en specifieke aanvraag: GBS en onderzoeksmateriaal: rectovaginaal. Vul bij bijzonderheden in dat het een zwangere betreft. Voeg de aanvraagformulieren bij in het bewaarzakje.
 7. *Kliniek*: breng de kweek zo spoedig mogelijk naar het lab (Labmicta depot) en leg deze in de koeling. Plak het 2^e etiket in de daarvoor bestemde klapper.
Verloskundigen- en huisartsenpraktijk: de logistieke afhandeling van de verzending van de kweek verschilt per praktijk. De praktijken zijn op de hoogte van de praktische uitvoering hiervan.

Datum protocol

Gepubliceerd in 2018

Wijzigingen t.o.v de vorige versie

Niet van toepassing