

Titel

Medium risk indicaties (MR-indicaties)

Specialisme

Obstetrie en gynaecologie

Soort document

VSV-protocol/werkafspraken

Doel

Eenduidigheid rondom de MR-indicaties

Medium risk indicaties

- Fluxus in voorgeschiedenis
- Manuele placenta verwijdering in voorgeschiedenis
- SSRI gebruik in zwangerschap
- Benzodiazepine gebruik in zwangerschap
- BMI >35, maar <40
- Sociale indicatie / thuis situatie (vastgelegd in zwangerenbespreking)
- >24 uur gebroken vliezen
 - o tot het moment van bijstimulatie, in de regel wordt bijstimulatie gestart op de ochtend nadat de vliezen 48 uur gebroken zijn
- Cliënten uit asielzoekerscentrum (AZC)
- Een congenitaal afwijkend kind waarbij consult kinderarts binnen 24-48 uur geïndiceerd is, bijvoorbeeld pes equinovares of pyelectasie met advies antibiotica te starten post partum.
 - o indien toch wens thuispartus bestaat moet dit bespreekbaar zijn indien verantwoord
- Hoogstaand caput durante partu
- Een eerstelijns verloskundige die niet NLS-geschoold is in het SKB
- “niet pluis gevoel”
 - o in principe alleen na overleg met dienstdoend gynaecoloog
- Overige indicaties vastgelegd in zwangerenbespreking

Datum protocol

Gepubliceerd in 2015, herzien in 2017